



MALVONA

Benzocaína 0,2mg/ml

Borato de Sódio 60mg/ml

Cloreto de Cetilpiridínio 1mg/ml

PARA COMBATER AS AFTAS E A DOR DE GARGANTA.

Possui ação antisséptica e anestésica, promovendo o alívio dos sintomas da dor de garganta e aftas. Uso adulto.

MODO DE USAR:

Bochechos ou gargarejos: Agite antes de diluir. Dilua uma colher das de chá (5mL) em meio copo de água (50mL) fria ou morna. Usar 4 a 5 vezes ao dia, ou de acordo com as instruções médicas ou odontológicas. No caso de aftas, se preferir, embeba um pedaço de algodão na solução e aplique diretamente sobre a lesão. Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso de MALVONA®. Não ingerir.

APRESENTAÇÃO

Frasco de 100mL e 200mL.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

MS 1.0143.0068

Malvona é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o Médico deverá ser consultado.

Fabricado por: Laboratório Daudt Oliveira Ltda. Rua Simões da Mota, 57 - Rio de Janeiro - RJ. CEP 21540-100. CNPJ: 33.026.055/0001-20. Reg MS 2.0250.0073. VISITE O DENTISTA REGULARMENTE. Resp Técnico: Roquele Gomes Focco, CRF-RJ nº7193.

